

Agenda



Curso de bienestar de los animales durante el transporte. Entre los días 24 julio y 3 de agosto a las cuatro de la tarde, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Precisa inscripción.

Visita a la colección de frutales tropicales en la Finca la Cueva del Polvo. Día día 26 de julio a las diez y media de la mañana en Guía de Isora. Organizan Agencias de Extensión Agraria e ICIA.



Cursos de manipulador de productos fitosanitarios

[Ver más actividades](#)

Avisos fitosanitarios



Con respecto al oidio o "ceniza":

Riesgo **MEDIO** en zonas baja de Ycoden-Daute, Valle de La Orotava y Tacoronte-Acentejo, así como en zonas medias de Abona, Isora y Valle de Güimar.

Con respecto al mildiu:

Riesgo **MEDIO** en zonas medias y altas de Ycoden-Daute, Valle de La Orotava y Tacoronte-Acentejo.

Y con respecto a botrytis o "pudrición":

Riesgo **MEDIO** en las zonas bajas y media Ycoden-Daute, Valle de La Orotava y Tacoronte-Acentejo.

A la hora de dar los tratamientos hay que tener en cuenta que con respecto a la incidencia del oidio y del mildiu en racimo, que a partir del inicio de envero disminuyen drásticamente. Los ataques más importantes de botrytis se producen a partir del envero y, especialmente, durante la maduración. Si el tiempo es húmedo y existen bayas con daños de polilla del racimo, oidio, etc. El momento más oportuno para luchar contra esta enfermedad es al iniciarse el envero (5%-10% de granos enverados). A la hora de elegir un producto para aplicar un tratamiento hay que tener en cuenta la restricción del uso de determinados productos, que solo se pueden emplear hasta el envero y el plazo de seguridad de los mismos.



Frutales

En general, los registros de capturas de la mosca de la fruta en las trampas de seguimiento distribuidas por toda la Isla han **aumentado considerablemente** en las últimas semanas. Por ello, se recomienda colocar trampas con atrayente alimenticio, recoger con frecuencia la fruta bichada del suelo y, si es necesario, aplicar tratamiento cebo con productos autorizados para el cultivo y plaga.



Papa
Retire las **papas bichadas** del terreno. Pueden enterrarse profundamente o llevarse a los contenedores situados en La Cooperativa Las Medianías en San Juan de la Rambla, Cooperativa Icod de los Trigos, Las Llanadas, Benijos, Cooperativa CASMI en San Miguel o bien en las plantas de transferencia de La Guancha, La Orotava, El Rosario, Arona o PIRS en Arico, previa solicitud en las Agencias de Extensión Agraria.

[Ver más avisos fitosanitarios](#)

Ayudas y subvenciones


Subvención destinada al sector vitícola de Tenerife
Hasta el día 28 de julio de 2017

Más información
Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

[Ver más ayudas y subvenciones](#)

De su interés

Julio, piña tropical
Tegueste Agrícola



App AgroCabildo

[Ver más](#)

Inscripción en cursos
Extensión Agraria y Desarrollo Rural



Recomendaciones de riego

Platanera




[Ver otros cultivos](#)

Publicaciones

Cálculo de soluciones nutritivas en suelo y sin suelo

Ríos Mesa, Domingo J.
Santos Coello, Belarmini



La formulación de las soluciones nutritivas para fertirrigación es una parte importante de la técnica agronómica, siendo una de los asesoramientos más solicitados al personal técnico. Sin embargo...

[Ver más publicaciones](#)

Audiovisual



Cebolla de Tenerife



Otras campañas

[Ver más videos](#)

De su interés



www.agrocabildo.org

