

Recomendaciones para el aguacate después de los daños causados por el temporal reciente:

1.- Mantener una humedad adecuada en el suelo hasta una profundidad de 40 cm., mojando una superficie de aproximadamente la mitad de la superficie que sombrea la copa del árbol. No mojar el tronco en árboles adultos.

2.- Quitar parte de la flor por la zona más dañada por el viento. Poda de parte de ramas.

3.- Blanquear troncos y ramas, incluso frutos, por la cara sur para evitar quemaduras de sol. Productos a base de cal, como cal apagada, carbonato cálcico y caolín son productos adecuados para ello.

4.- Aplicar, moderadamente, abonos estimulantes de la vegetación a base de aminoácidos o productos similares, tanto por el suelo como por las hojas.

Para más información, acuda a su Agencia de Extensión Agraria o a su departamento técnico.

Recomendaciones para la platanera después de los daños causados por el temporal reciente:

1.- Mantener una humedad adecuada en el suelo hasta una profundidad de 30 cm., mojando una superficie de aproximadamente la mitad de la superficie que sombrea la copa del árbol. Siga las recomendaciones de riego de Agrocabildo.

2.- Aplicar, moderadamente, abonos estimulantes de la vegetación a base de aminoácidos. Además, aporte productos a base de calcio y evite la aplicación de productos que contengan potasio.

Para más información, acuda a los técnicos de su OPP o Agencia de Extensión Agraria.

Recomendaciones para la papa después de los daños causados por el temporal reciente:

Si la planta no ha sido tronchada a nivel de cuello (foto) o no está en su totalidad seca:

1.- Aplicar riegos si se dispone del mismo.

2.- En el caso de que los tallos se hayan quedado al descubierto, volver a cubrirlos.

3.- Aplicación en pulverización foliar (por las hojas) de un producto a base de aminoácido o similar, a la dosis máxima autorizada (no mezclar con productos que contengan cobre).

