

MEDIDAS DE CONTROL DE LA POLILLA DEL TOMATE (TUTA ABSOLUTA) RECOMENDADAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS DE CULTIVO.

Belarmino Santos Coello

Desde principios del 2009, se han detectado en Canarias una nueva plaga en tomate, **extremadamente dañina**: la “Polilla del Tomate” (nombre científico *Tuta absoluta*). Esta polilla es especialmente dañina porque las orugas están dentro de minas en hojas, tallos y **fruto**. Además es relativamente difícil de controlar con insecticidas y se puede reproducir con mucha rapidez. En este año, ya se están observando ataques preocupantes de esta plaga en Tenerife. Si se dejan abandonados los cultivos ya terminados es bastante probable que las plantaciones para verano tengan problemas graves.

Para evitar que los cultivos terminados sean un foco de plaga, tanto para nuestras siguientes plantaciones como para cultivos vecinos existen una serie de normas para evitar que la polilla pueda infectar nuevas plantaciones.

- ✓ Una vez realizada la última recolección de tomate, se recomienda dar un tratamiento fitosanitario:
 - Si el cultivo termina con alta presencia de polilla, dar un tratamiento con alguno de los productos para adultos más un producto para larvas. Se puede añadir algún herbicida de contacto para secar el cultivo más rápidamente y evitar la alimentación de la polilla. Consulte con su Técnico o en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural para la elección del producto más adecuado.
 - Si el cultivo termina con baja presencia de polilla y alta población de enemigos naturales, se recomienda un tratamiento con alguno de los productos para control de larvas.
- ✓ Una vez realizado el tratamiento, se debe arrancar y retirar el cultivo **ANTES DE 10 DÍAS**, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones
 - Deben retirarse todos los restos de cultivo anteriores, **teniendo especial cuidado con los tomates que se quedan en el suelo**.
 - Una vez retiradas del invernadero, los restos deben enterrarse o cubrirse con un plástico durante un tiempo (de 3 a 6 semanas). Si se van a compostar, se recomienda también cubrir las pilas. En Murcia se ha visto que también se logra un buen control, usándolo como forraje para ovejas, metiendo los animales en el invernadero.
 - En el caso de llevar los restos de cultivo a otros lugares, taparlos con una lona o malla para evitar la dispersión de la plaga.
- ✓ Una vez retirado el cultivo, se recomienda realizar un pase de arado al invernadero, para destruir las pupas que se hayan refugiado en el suelo.
- ✓ En el caso de haber tenido ataques importantes en el cultivo, puede ser recomendable realizar una desinfección del suelo, preferentemente con biosolarización o si esto no es posible, con algún fitosanitario permitido.

Para poder tener a raya esta nueva plaga es muy importante que se cuiden las plantaciones hasta el final de la recolección, que no se retrase el levantamiento del cultivo y que no se deje material contaminado por la plaga. Si hacemos esto entre todos, será más fácil el control de la polilla del tomate en cultivos de verano.