



Actualidad del sector agrícola, ganadero y del desarrollo rural

Ayudas y subvenciones



Subvención para la alimentación complementaria de las abejas de la isla de Tenerife

Plazo de presentación:
hasta el **18 de agosto**.

[Enlace al trámite](#)



AYUDAS

Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP), prevista en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias Campaña 2025

Productores de Canarias de vides destinadas a la producción de vinos con denominación de origen protegida.

Plazo hasta el **12 de septiembre**.



Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con DOP, prevista en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias Campaña 2025

Plazo de presentación:
hasta el **12 de septiembre**.


[Enlace al trámite](#)



AGROCABILDO TENERIFE



Publicaciones



Manual de fertirrigación sostenible. Cálculo de soluciones nutritivas en suelo y sin suelo

[Enlace a la publicación](#)

De interés



Manjares del Mercado 2025

Talleres gastronómicos organizados por la Asociación del Mercado del Agricultor y Artesano de la Villa de Tegueste, junto con Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias)

[Enlace](#)

Aviso fitosanitario en viña



**Periodo: 30 de julio
al 5 de agosto**

Estado del cultivo: Se mantienen riesgos elevados de oidio en distintas zonas vitícolas y riesgo medio de mildiu en algunas comarcas.

Se recomienda especial atención a posibles ataques de botrytis en variedades en fase de envero.

Niveles de riesgo:

Oídio

Riesgo alto en:

- Todas las zonas bajas de la isla
- Zonas medias de Ycoden-Daute, Valle de La Orotava y Tacoronte-Acentejo
- Zonas altas de Ycoden-Daute y Tacoronte-Acentejo

Riesgo medio en:

- Zona alta del Valle de La Orotava
- Zonas medias de Isora, Abona y Valle de Güímar

Mildiu

Riesgo medio en:

- Zonas medias y altas de Ycoden-Daute
- Zona alta del Valle de La Orotava
- Todas las zonas de Tacoronte-Acentejo

Botrytis

Atentos al inicio del envero:

- Los ataques de botrytis se intensifican a partir del envero, especialmente en condiciones de humedad y presencia de daños por polilla u oidio.
- El momento óptimo para aplicar tratamiento es al inicio del envero (5%-10% de granos enverados), dirigiendo el producto a los racimos por ambas caras de la planta.
- En variedades de racimos compactos, se recomienda un tratamiento previo en el estado de cierre del racimo.

Aviso fitosanitario en viña

 Los niveles de riesgo se han determinado según el análisis de las condiciones meteorológicas recientes, las predicciones del clima y las observaciones de campo de los Agentes de Extensión Agraria.

Recomendaciones:

- ✓ En las zonas con riesgo, aplicar un tratamiento preventivo-curativo si no se ha tratado en los últimos 10-14 días.
- ✓ En el resto de zonas, vigilar el cultivo y tratar si se observan síntomas y no se ha realizado tratamiento en los últimos 10-14 días.
- ✓ Recordar que la sensibilidad del racimo a estas enfermedades disminuye drásticamente a partir del envero.
-  Consulta más información por comarcas en  www.agrocabildo.org/avisos_vina.asp

Recomendaciones de riego

Recomendaciones de riego en el cultivo de platanera

Las recomendaciones semanales de riego de platanera están disponibles en www.agrocabildo.org.

Puede suscribirse al servicio gratuito de recomendación de riego semanal a través de correo electrónico

[Accede a las recomendaciones](#)

Síguenos en nuestras redes sociales

