ANEXO I: TABLA DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2 DE MARZO DE 2018.

Grupo químico	Materia activa, composición y tipo de formulación	Toxicología	P.S. días	Araña roja	Mangla o cochinilla	Moscas Blancas	Nematodos	Orugas	Picudo	Pulgones	Trips	Lapilla	Moteado	Cercosporiosis
Aceite mineral	Aceite parafínico 83% EC		NP	+	+	+				+				
Aceite orgánico	Aceite de naranja 6% SL		NP			+								
Compuesto inorgánico	Aceite de parafina 72% EC		NP		+									
	Aceite de parafina 83% EC		NP	+	+	+				+				
	Azufre 80% SC	Xi	NP	+										
	Azufre 80% WG	Xi	NP	+										
	Azufre 80% WP	Xi	NP	+										
	Azufre 80% DP	Xi	NP	+										
	Azufre 90% DP	Xi	NP	+										
Derivados de ácidos tetrónicos y tetrámicos	Spirodiclofen 24% SC (1)	Xi	14	+										
Cetoenol	Spirotetramat 10% SC (2)	Xi	14		+	+								
Jabón potásico	Ácidos grasos vegetales 15% SL	Xi	3			+								
Jabón potásico	Ácidos grasos vegetales 40,13% SL	Xi	NP			+								
Derivados de la piridina	Piriproxifen 10% EC (17)	Xn	14		+	+								
Derivados vegetales	Azadiractín 3,2% EC	Xn	NP	+		+		+	+					
	Azadiractín 4,5% EC	Xn	NP	+		+		+	+					
Insecticida microbiano	*Bacillus thuringiensis* Kurstaki 11,8% SC	Xi	NP					+						
	Bacillus thuringiensis Kurstaki 16% SC	Xi	NP					+						
	Bacillus thuringiensis Kurstaki 16% WP	Xi	NP					+						
	Bacillus thuringiensis Kurstaki 18% WG	Xi	NP					+						
	Bacillus thuringiensis Kurstaki 32% WG	Xi	NP					+						
	Bacillus thuringiensis Kurstaki 32% WP	Xi	NP					+						
Insecticida microbiano	*Bacillus subtilis* 15,67% WP	Xi	1											+

Grupo químico	Materia activa, composición y tipo de formulación	Toxicología	P.S. días	Araña roja	Mangla o cochinilla	Moscas Blancas	Nematodos	Orugas	Picudo	Pulgones	Trips	Lapilla	Moteado
Piretroide	Lambda cihalotrín 2,5% WG (3)	Xn	7					+					
	Lambda cihalotrín 10% SC (4)	Xn	7					+					
Cloronicotinílico	Acetamiprid 20% SG (5)	Xn	21		+	+							
Tiadiazinona	Buprofezín 25% WP (6)	Xn	7		+	+							
	Clorpirifos 25% CS (16)	Xi	28		+						+		
	Clorpirifos 48% EC (15)	Xn	21		+	+		+	+		+	+	
	Fenamifos 24% CS (7)	Xn	15				+		+				
	Fenamifos 40% EC (7)	T	15				+		+				
	Fostiazato 15% EC (8)	T	NP				+		+				
Reguladores de crecimiento	Hexitiazox 10% WP (9)	Xn	14	+									
Hidroxianilidas	Etoxazol 11% SC (10)	Xn	3	+									
Oxadiacina	Indoxacarb 30% WG (11)	Xn	6					+					
Carbamato	Oxamilo 10% SL (14)	T	7	+			+		+	+			
Tetrazina	Clofentezin 50% SC (12)	Xn	14	+									
Spinosina	Spinosad 48% SC (13)	Xn	7					+			+		
Derivados del cobre	Oxicloruro de cobre 11% + sulfato cuprocalcico 10% WP	Xn	15										+
	Oxicloruro de cobre 38 % SC	Xn	15										+
	Oxicloruro de cobre 52 % SC	Xn	15										+
	Oxicloruro de cobre 70 % SC	Xn	15										+
	Sulfato tribásico de cobre 19% SC	Xn	15										+

(1) Dosis 0,02% con un volumen de caldo entre 1500 a 3000 litros/Ha. Un solo tratamiento por campaña.
(2) Máximo dos tratamientos por campaña. Aplicar durante el periodo vegetativo hasta la emisión de la hoja brácteal y desde la caída de pistilos en todo el racimo (desflorillado manual y/o caída natural), con o sin embolsado, hasta recolección. No aplicar desde la emisión del racimo (aparición hoja brácteal) hasta caída de pistilo en todo el racimo (desflorillado manual y/o caída natural).
(3) Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 kg/ha.
(4) Efectuar una aplicación por campaña con un volumen de caldo de 1.500-2.000 l/Ha manualmente o mediante tractor.
(5) Máximo 2 aplicaciones. Uso en invernadero, aplicar dosis de 320 g/ha.
(6) ***Fecha límite de utilización el 21/06/2018.***
(7) Aplicar mediante riego por goteo, sólo en invernaderos con estructura permanente.
(8) Solo riego por goteo. Dosis 15 litros/Ha. Aplicar mediante riego por goteo durante la etapa vegetativa.
(9) Contra huevos, larvas y ninfas. Aplicar en pulverización foliar, a la aparición de las primeras formas móviles.
(10) Aplicar en pulverización normal al inicio de la infestación, al aire libre mediante tractor y en invernadero con lanza o pistola sólo cuando el desarrollo vegetativo sea inferior a 1 m. de altura. Aplicar con un máximo de 0,5 l/ha.
(11) Steward (En el uso al aire libre, la dosis máxima será de 215 g de producto/Ha. En invernadero, bajo cubierta (malla) la dosis máxima 0,12 kg/ha. Vol. caldo: 3.000-5.400 l/ha, con un máximo de 3 aplicaciones/campaña, con un intervalo de 30 días). Explicit 30 WG (Sólo al aire libre. Dosis máxima de 215 g/ha).
(12) ***Fecha límite de utilización el 10/04/2018.***
(13) Efectuar una única aplicación sin sobrepasar los 0,3 l/ha.
(14) ***Fecha límite de utilización 16/03/2018.***
(15) ***Fecha límite de utilización el 28/06/2018.***
(16) ***Fecha límite de utilización el 17/04/2018.***
(17) Dosis 50-75 ml/Hl.