

Colocar acolchado de malla en el suelo para evitar que las polillas de *Tuta absoluta* pupen en el suelo.



10-15 días antes de plantar, colocar trampas cromáticas amarillas y/o azules, (añadirle algunas feromonas). Atraen a los adultos de *Tuta absoluta* (machos y hembras), que puedan encontrarse dentro del invernadero. Colocarlas principalmente en las orillas del invernadero.



Colocar 2 trampas/ha para monitoreo, en las puertas o zonas donde los ce-rramientos estén en peor estado.

¡COLABORE!
El control de *Tuta* sólo es posible si TODOS realizamos las medidas recomendadas.
¡Evite que las poblaciones de *Tuta* alcancen niveles altos. Cuide las plantaciones hasta el final, no retrase el levantamiento del cultivo ni deje material vegetal contaminado, en especial los frutos!

La Polilla del Tomate *Tuta absoluta* Meyrick

**Medidas recomendadas
 para el levantamiento del cultivo.**

Es fundamental realizar correctamente la retirada del cultivo una vez acabado el ciclo de producción, ya que puede convertirse en un importante foco de plaga.

Un vez realizada la última recolección de tomates se recomienda ejecutar las siguientes labores culturales:



OPCIÓN A

Si el cultivo finaliza con **alta precisión de *Tuta absoluta*** aplicar un tratamiento fitosanitario con:

- * Adulticida (cipermetrina o metil clorpirifos) +
- *Larvicida (Indoxacarb, Spinosad, Emamectina*, Flubendiamida*, Metaflumizona*, Rynaxypyr*) +
- * Mojanete.

OPCIÓN B

Si el cultivo finaliza con **baja precisión de *Tuta absoluta*** y **enemigos naturales** aplicar un tratamiento fitosanitario con:

- * Larvicida (*Bacillus thuringiensis*) +
- * Mojanete.

(*) Autorización excepcional hasta el 14 de julio de 2010.

A los tratamientos fitosanitarios se les puede añadir un **herbicida de contacto**.

En todos los casos es conveniente el enterrado o cobertura con plástico del material vegetal en la propia explotación, para evitar la dispersión de la plaga.

Una vez tratado:

Arrancar y retirar los restos de cultivos antes de 10 días.



¡IMPORTANTE! En el invernadero no debe quedar ningún resto de cultivo ni malas hierbas.

Tener especial cuidado de que no queden frutos de tomate ya que estos pueden albergar larvas de *Tuta absoluta*.



Los restos de cultivo hay que transportarlos correctamente a los lugares de vertido.

Deben ir tapados con lonas o mallas de 6x9 y sin roturas, así evitamos la dispersión de la plaga durante el transporte de los mismos.



Una vez retirado el cultivo:

- Dejar el invernadero limpio un periodo mínimo de 6 a 8 semanas antes de volver a plantar.
- Realizar un pase de arado al invernadero (si el cultivo es en suelo), de esta manera destruimos las pupas que se encuentran en el suelo.
- Desinfectar el cultivo químicamente, por solarización o biosolarización.

Antes de plantar:



- Utilizar mallas lo más tupidas posibles, como mínimo 6X9 hilos/cm2
- Reparar todas las roturas del invernadero.
- Colocar doble puerta, entre ambas puertas colocar placas adhesivas amarillas y una trampa delta.
- Tratar las estructuras del invernadero con productos aduicticidas para *Tuta absoluta*, mojado muy bien (casi lavando) soportes, mallas, suelos.
- Aplicar un espolvoreo de azufre 40 kg/ha

